

Identification du service

Dans le cadre de la réalisation d'un protocole d'accueil et d'information de l'enfant opéré avec :  
le service de chirurgie de l'enfant de Mulhouse,  
le service de pédiatrie médico-chirurgical de Colmar,  
l'association SPARADRAP et la Fondation de France

## Evaluation de l'anxiété préopératoire de l'enfant

A remplir à l'admission, en service d'hospitalisation.

Date :

étiquette

Niveau d'anxiété du parent à l'admission :

père  mère

élevé   
moyen   
peu élevé   
inexistant

Parent accompagnant :

oui  non

Si oui :  
père  mère

Anxiété du parent au départ de l'enfant au bloc :

père  mère

élevé   
moyen   
peu élevé   
inexistant

L'enfant a-t-il vécu de précédentes séparations : oui  non

Comment c'est passé la séparation ?	très difficilement	plutôt difficilement	assez facilement	très facilement	ne sait pas
1ère garde par un baby-sitter ponctuel (non-membre de la famille)					
entrée à la crèche					
entrée à la halte garderie					
entrée à l'école maternelle					
entrée à l'école primaire					
départ pour la première colonie					

Observations particulières :

# Score d'anxiété préopératoire "YALE"

A remplir au bloc opératoire par une IADE ou une IBODE de préférence à l'insu de l'enfant, à l'installation de l'enfant sur la table d'opération.  
Entourer un chiffre pour chaque activité.

ITEMS	NOTE
<b>A. ACTIVITE</b>	
1. Regarde autour de lui, curieux, peut explorer les objets, ou reste calme	1
2. N'explore pas, peut regarder vers le bas, peut remuer nerveusement les mains ou sucer son pouce (son doudou)	2
3. Se tortille, bouge sur la table, peut repousser le masque	3
4. Tente activement de s'échapper, repousse avec les pieds et les mains, peut bouger tout le corps	4
<b>B. VOCALISATIONS</b>	
1. Pose des questions, fait des commentaires, babille	1
2. Répond aux questions des adultes mais à voix basse, « baby talk », ou ne fait que des signes de tête	2
3. Silencieux, aucun son, ne répond pas aux adultes	3
4. Pleurniche, se plaint, gémit	4
5. Pleure, peut crier « non »	5
6. Pleure et crie de façon continue (audible continuellement à travers le masque)	6
<b>C. EXPRESSION EMOTIONNELLE</b>	
1. Manifestement heureux, souriant	1
2. Neutre, pas d'expression faciale visible	2
3. Inquiet (triste) ou effrayé ; yeux effrayés, tristes, ou pleins de larmes	3
4. En détresse, pleure, totalement bouleversé, peut avoir les yeux écarquillés	4
<b>D. ETAT D'EVEIL APPARENT</b>	
1. Alerté, regarde occasionnellement autour de lui, observe ce que l'anesthésiste lui fait	1
2. Renfermé sur lui-même, tranquillement assis, peut sucer son pouce, ou visage tourné vers l'adulte	2
3. Vigilant, regarde rapidement tout autour de lui, peut sursauter aux bruits, yeux grands ouverts, corps tendu	3
4. Etat de panique, pleurniche, peut pleurer ou repousser les autres, se détourne	4
<b>TOTAL</b>	<b>/18</b>

**Prémédication** : oui   
non

Type :  
.....

**1ère opération** : oui   
non

si non combien :  
.....

à quel(s) âge(s) :  
.....

**Observations particulières** :