

**LES DOULEURS PROVOQUEES
PAR UN SOIN
A L'HOPITAL DE JOUR PEDIATRIQUE**

Etiquette patient

Date / /	PDE	AP
-------------	-----	----

Ponction lombaire **Pose aiguille de PAC** **Prélèvement sanguin** **Myélogramme**
Pansement de cathéter **Pose de perfusion**

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Aucune EMLA® MEOPA® Actiskénan® Nubain®
 Anesthésie locale : Atarax Hypnovel Autre :

MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA DOULEUR AIGUE

Aucune Expression verbale Gestes d'autoprotection Aucune
 Masque de douleur Repli sur soi Diminution de la concentration
 Modification du tonus musculaire
 Réactions du système nerveux autonome : Transpiration abondante Modification de la respiration
 Expressions non verbales : Gémissements Pleurs Irritabilité Soupirs Agitation

SCORE D'EVALUATION DE L'INTENSITE DE LA DOULEUR	RESULTATS OBTENUS						
	GRAVITE DES SYMPTOMES	sévère	important	modéré	léger	aucun	
CHEOPS <input type="checkbox"/> EVA <input type="checkbox"/> /	→ Agitation, irritabilité → Peur associée → Anxiété associée						
INTERVENTIONS REALISEES	INTENSITE DE LA DOULEUR	sévère	important	modéré	léger	aucun	
	Présence <input type="checkbox"/> Conduite à tenir face à la douleur <input type="checkbox"/> Amélioration du sentiment de sécurité <input type="checkbox"/> Aménagement du milieu ambiant <input type="checkbox"/>	→ Durée des épisodes douloureux → Expression verbale de la douleur → Faciès douloureux → Agitation → Tension musculaire → Transpiration					
	Distraction <input type="checkbox"/> Massage <input type="checkbox"/> Musicothérapie <input type="checkbox"/> Toucher <input type="checkbox"/>	EFFETS INDUITS	sévère	important	modéré	léger	aucun
	CONTRÔLE DE LA DOULEUR	Jamais démontré	Rarement démontré	Parfois démontré	Souvent démontré	Toujours démontré	
	→ Utilise des mesures préventives → Utilise des moyens de soulagement de la douleur non médicamenteux → Utilise les ressources disponibles						