Evaluation de l'anxiété préopératoire de l'enfant

Date :

*Etiquette d'hospitalisation
de l'enfant*

Niveau d'anxiété du parent

En consultation
d'anesthésie :

père mère

élevé

moyen

peu élevé

inexistant

Parent accompagnant :

oui non

Niveau d'anxiété de l'enfant

en consultation
d'anesthésie :

élevé

moyen

peu élevé

inexistant

Formation playmobil –jeu

oui

non

boite à bisous

Bénéfices parents :

oui

non

Bénéfices enfant :

oui

non

Niveau anxiété du parent et de l'enfant à l'admission :

	P	E
élevé	☐	☐
moyen	☐	☐
peu élevé	☐	☐
inexistant	☐	☐

Anxiété du parent au départ de l'enfant au bloc :

père mère

élevé

moyen

peu élevé

inexistant

Niveau anxiété de l'enfant au départ au bloc :

élevé

moyen

peu élevé

inexistant

INDUCTION : Calme

Agitation modérée

difficile –agitation +++

Masque

Voie IV

Réveil

Calme

Pleurs

Très Agité

Score de Chéops :

Au réveil :

Au départ de SSPI :

Nubain :

Dose :

Observations particulières :

Score d'anxiété préopératoire "YALE"

A remplir au bloc opératoire par une IADE ou une IBODE de préférence à l'insu de l'enfant, à l'installation de l'enfant sur la table d'opération.
Entourer un chiffre pour chaque activité.

ITEMS	NOTE
A. ACTIVITE	
1. Regarde autour de lui, curieux, peut explorer les objets, ou reste calme	1
2. N'explore pas, peut regarder vers le bas, peut remuer nerveusement les mains ou sucer son pouce	2
3. Se tortille, bouge sur la table, peut repousser le masque	3
4. Tente activement de s'échapper, repousse avec les pieds et les mains, peut bouger tout le corps	4
B. VOCALISATIONS	
1. Pose des questions, fait des commentaires, babille	1
2. Répond aux questions des adultes mais à voix basse, « baby talk », ou ne fait que des signes	2
3. Silencieux, aucun son, ne répond pas aux adultes	3
4. Pleurniche, se plaint, gémit	4
5. Pleure, peut crier « non »	5
6. Pleure et crie de façon continue (audible continuellement à travers le masque)	6
C. EXPRESSION EMOTIONNELLE	
1. Manifestement heureux, souriant	1
2. Neutre, pas d'expression faciale visible	2
3. Inquiet (triste) ou effrayé ; yeux effrayés, tristes, ou pleins de larmes	3
4. En détresse, pleure, totalement bouleversé, peut avoir les yeux écarquillés	4
D. ETAT D'EVEIL APPARENT	
1. Alerté, regarde occasionnellement autour de lui, observe ce que l'anesthésiste lui fait	1
2. Renfermé sur lui-même, tranquillement assis, peut sucer son pouce, ou visage tourné vers l'adulte	2
3. Vigilant, regarde rapidement tout autour de lui, peut sursauter aux bruits, yeux grands ouverts, corps tendu	3
4. Etat de panique, pleurniche, peut pleurer ou repousser les autres, se détourne	4
TOTAL	/18

Prémédication : oui
non

Type :
.....

1ère opération : oui
non

si non combien :
.....
.....

Observations
particulières :