

Evaluation de l'anxiété préopératoire de l'enfant

A remplir à l'admission, en service d'hospitalisation.

Date :

Etiquette d'hospitalisation
de l'enfant

**Niveau d'anxiété du parent
à l'admission :**

père mère

élevé
moyen
peu élevé
inexistant

Parent accompagnant :

oui non

Si oui :
père mère

**Anxiété du parent au départ
de l'enfant au bloc :**

père mère

élevé
moyen
peu élevé
inexistant

L'enfant a-t-il vécu de précédentes séparations : oui non

Comment c'est passé la séparation ?	très difficilement	plutôt difficilement	assez facilement	très facilement	ne sait pas
1ère garde par un baby-sitter ponctuel (non-membre de la famille)					
entrée à la crèche					
entrée à la halte garderie					
entrée à l'école maternelle					
entrée à l'école primaire					
départ pour la première colonie					

Observations particulières :

Score d'anxiété préopératoire "YALE"

A remplir au bloc opératoire par une IADE ou une IBODE de préférence à l'insu de l'enfant, à l'installation de l'enfant sur la table d'opération.
Entourer un chiffre pour chaque activité.

ITEMS	NOTE
A. ACTIVITE 1. Regarde autour de lui, curieux, peut explorer les objets, ou reste calme 2. N'explore pas, peut regarder vers le bas, peut remuer nerveusement les mains ou sucer son pouce (son doudou) 3. Se tortille, bouge sur la table, peut repousser le masque 4. Tente activement de s'échapper, repousse avec les pieds et les mains, peut bouger tout le corps	1 2 3 4
B. VOCALISATIONS 1. Pose des questions, fait des commentaires, babille 2. Répond aux questions des adultes mais à voix basse, « baby talk », ou ne fait que des signes de tête 3. Silencieux, aucun son, ne répond pas aux adultes 4. Pleurniche, se plaint, gémit 5. Pleure, peut crier « non » 6. Pleure et crie de façon continue (audible continuellement à travers le masque)	1 2 3 4 5 6
C. EXPRESSION EMOTIONNELLE 1. Manifestement heureux, souriant 2. Neutre, pas d'expression faciale visible 3. Inquiet (triste) ou effrayé ; yeux effrayés, tristes, ou pleins de larmes 4. En détresse, pleure, totalement bouleversé, peut avoir les yeux écarquillés	1 2 3 4
D. ETAT D'VEUIL APPARENT 1. Alerte, regarde occasionnellement autour de lui, observe ce que l'anesthésiste lui fait 2. Renfermé sur lui-même, tranquillement assis, peut sucer son pouce, ou visage tourné vers l'adulte 3. Vigilant, regarde rapidement tout autour de lui, peut sursauter aux bruits, yeux grands ouverts, corps tendu 4. Etat de panique, pleurniche, peut pleurer ou repousser les autres, se détourne	1 2 3 4
TOTAL	/18

Prémédication : oui
non

Type :
.....

1ère opération : oui
non

si non combien :
.....

à quel(s) âge(s) :
.....

Observations particulières :